

riskler anlatılmasına rağmen hastasının taburculuğunu istediğine dair yazı imzalatılarak hastasını hastaneden çıkarabilmektedir. Çalışmamızın amacı aile isteği ile taburcu olan hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin araştırılmasıdır.

YÖNTEM: Çalışmaya 01.01.2015 tarihinden itibaren, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri servislere çeşitli sebeplerle yatışı yapılan ve kefaletname ile taburcu edilen yatış sırasına göre ardışık olarak 50 tane erkek, 50 tane kadın hasta dahil edilmiştir. Yapılan bu kesitsel çalışmada hasta verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik ve klinik form aracılığı ile hastane dijital hasta veri sisteminden toplanmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya 50 kadın, 50 erkek 100 hasta alınmıştır. Yaş ortalaması 32.41'dir. Erkek hastaların ortalama yatış süresi 6.7 gün iken kadın hastaların 4 gündür. Hastaların sadece %5'inin sosyal güvencesi olmamakla birlikte olmayanların tamamı kadındır. Hastaların %73'ü acil servisten, %27'si poliklinikten yatırılmıştır. Erkeklerde en sık rastlanan tanı psikotik bozukluklar (%34) iken kadınlarda ise bipolar bozukluk (%17). Kadınların %74'ünün, erkeklerin ise %66'sının bir psikiyatri kliniğine ilk yatışlarıdır. Kadınların %52'si erkeklerin ise %46'sı taburculuk sonrası kontrole gelmemiştir. Hastaların %12'si taburculuk sonrası iki ay içinde tekrar yatırılmıştır.

TARTIŞMA: Uzun dönem tedavi gerektiren hastalıkları olsa da tedavisi tamamlanmadan taburcu edilen hastaların tekrar hastaneye başvuru oranları düşüktür. Ülkemizde ruh sağlığı yasasının olmaması hem hastaların tedaviyi sürdürmelerini zorlaştırmakta hem de sağlık çalışanlarını uygulamada ne yapacakları konusunda ikilemde bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstemsiz yatış, kefaletname, erken taburculuk

Kaynaklar

Kalbert T, Glöckner M, Schüttwohl M (2008) Involuntary vs. voluntary hospital admission: A systematic literature review on outcome diversity. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 258(4): 195-209.

PB-178

HELİKOBACTER PYLORİ ERADİKASYON TEDAVİSİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KISA PSİKOTİK ATAĞ: BİR OLGU SUNUMU

Arif Çipil, Meliha Zengin Eroğlu, Fatma Gözde Avcı, Mecit Çalışkan, Alişan Burak Yaşar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH Psikiyatri bölümü İstanbul

AMAÇ: Helicobacter pylori, karsinojen olduğu saptanan ilk bakteri olup dünya nüfusunun yarısından fazlasında midede kolonize olan bir patojendir. Gastrit ve gastrik ülser, duodenal ülser, kanser, primer gastrik B-hücreli lenfoma (MALT lenfoma) gibi gastritle ilişkili hastalıkların en önemli nedenidir. Mideye ait yakınmalarla hekime başvuran hastalar tedavi edilmelidir. Tedavide en fazla kullanılan antibiyotikler klaritromisin, metronidazol ve amoksisilin'dir. Helicobacter pylori eradikasyonu 3'lü tedavisi sırasında akut manik psikoz, geçici psikotik atak, antibiomania görülebilmektedir. Bu olgu sunumunda, kısa psikotik atak ön tanısıyla kliniğimize yatırılıp tetkik edilirken Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi aldığı tesbit edilen bir olgu takdim edilecektir.

OLGU: 43 yaşında, erkek, üniversite mezunu, 20 yıldır evli, 4 çocuklu, bir fabrikada muhasebeci olarak çalışan hasta alınganlık,

şüphecilik, kaygı, olayları anlamlandırma, unutkanlık, uykusuzluk, ajitasyon, tahammülsüzlük gibi yakınmalarla acil servise başvurdu. Yapılan psikiyatrik görüşmede daha öncesinden bilinen psikiyatrik başvuru ve tedavisi yoktu. Aile öyküsü yoktu. Öyküsü derinleştirildiğinde 1 hafta önce endoskopi olduğu ve helicobacter pylori enfeksiyonu tesbit edildiği bu sebeple üçlü amoksisilin, klaritromisin, lansoprazol, tedavisi başlatıldığı öğrenildi. İleri tetkik nedeniyle servise yatırılan hasta psikiyatrik açıdan ilaçsız takip edildi. Amoksisilin, klaritromisin, lansoprazol tedavisinin kesilmesi ile 3-4 günde semptomları geriledi.

TARTIŞMA: Bu vakanın tanı koyma ve takip süreci psikiyatrik hastalıkların tanısında öykü, fizik muayene, kullanılan ilaçların ve laboratuvar tetkiklerinin çok önemli olduğunu göstermektedir. Psikiyatrik bulguları olan her hastada altta yatan ya da eş zamanlı tıbbi bir hastalığın ve ilaç kullanımının varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, psikoz, antibiyotik

Kaynaklar

Neff NE, Kuo G (2002) Acute manic psychosis induced by triple therapy for H. pylori. *The Journal of the American Board of Family Practice*, 15(1), 66-68.

Ortiz-Domínguez A, Berlanga C, Gutiérrez-Mora D (2004) A case of clarithromycin-induced manic episode (antibiomania). *The International Journal of Neuropsychopharmacology*, 7(01), 99-100.

PB-179

ŞİZOFRENİDE ÖFKELİ YÜZLERDEN ALGILANAN TEHDİTLE YÜZÜN İŞLEVSEL ANATOMİSİNİN İLİŞKİSİ

Melike Ezerbolat Özateş¹, Oğuzhan Herdi¹, Nilay Sedes¹, Eda Sonel², Asena Ulsan², Bora Baskak¹

¹Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Şizofreni hastalarının ailelerinin aşırı duygusal müdahaleleri ve dışa vuran duygulanımlarında olumsuz bir biçimin varlığı prognozu kötüleştirir. Bunun yanında hastaların öfke ve korku gibi olumsuz duygulara karşı olumlu duygulara göre daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarının karşılaştıkları öfkeli yüz ifadelerine karşı hissettikleri öznel tehdit algısının, algıladıkları yüzdeki öfke ifadesinin nesnel yoğunluğu ve işlevsel anatomisiyle ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir. Hastalık belirtilerinin ve duygu tanıma kusurunun bu sürece ne derecede etki ettiği de araştırılmıştır.

YÖNTEM: Bir üniversite hastanesinde takip edilen şizofreni olgularına (N=48) (VG) ve onlarla yaş ve cinsiyet bakımından benzeştirilmiş 51 sağlıklı kontrole (KG) Cohn-Kanade İşlevsel Ünitelerle Kodlanan Duygu Dışavurum Veritabanı (CK+) içinden seçilen, her biri nötral durumdan öfke duygusunun giderek belirginleştiği 6 adet yüz resminden oluşan toplam 21 öfke sekansı sunuldu. Bu yüz resimlerinin katılımcılarda ne zaman ve ne derecede tehdit algısı oluşturduğu ölçüldü. Her resim için kayıtlı bulunan, işlevsel anatomik birimlerin öfke duygusuna katılımıyla öznel yanıtlar arasında ilişki araştırıldı. Her iki grupta aynı veri tabanından oluşturulan bir duygu tanıma testi (DTT) aracılığıyla duygu tanıma becerisi ve VG'de Şizofrenide Pozitif Belirtileri Derecelendirme Ölçeği (PBDÖ) ile pozitif belirtilerin derecesi ölçüldü.

BULGULAR: Tüm sekanslarda hissedilen toplam tehdit algısı (TTA) VG'de KG'ye göre daha yüksekti ve PBDÖ-sanrı toplam madde puanıyla ilişkiliydi. DTT puanı VG'de KG'ye göre daha düşüktü fakat iki grupta da TTA ve TAZ ile ilişkili bulunmadı. VG'de KG'ye göre daha fazla