

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA AFEKTİF MİZAÇ VE SEROTONİN TRANSPORTER POLİMORFİZMİ İLİŞKİSİ

Serap Erdoğan Taycan¹, Aydın Rüstemoğlu²,
Alişan Burak Yaşar¹, Feryal Çam Çelikel³

¹Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

²Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

³Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü

AMAÇ: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve bipolar bozukluk (BB) arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmektedir. Mani, hipomani, siklotimi spektrumunun tamamı değerlendirildiğinde, OKB hastalarında yaklaşık %50 oranında siklotimik özellikler ve hipomanik belirtilere rastlandığı görülmektedir. OKB'de en çok çalışılan genlerden biri serotonin transporter (5-HTT) genidir. Genin promotör bölgesinde bir insersiyon/delesyon polimorfizmi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada OKB hastalarında 5-HTT polimorfizmi ile afektif mizaç arasında nasıl bir ilişki olduğunun ve afektif mizacın hastalığın özelliklerini nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmaya OKB tanısı almış, yaşları 18-65 arasında ardışık başvuran 100 hasta ile 100 sağlıklı kontrol alınmıştır. Hastalara Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ), Maudsley Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği (MOKBÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve The Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego (TEMPS-A) ölçeği uygulanmıştır. Sağlıklı kontrollere TEMPS-A verilmiştir. Katılımcıların genomik DNA yapıları venöz kan örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile çalışılmıştır.

BULGULAR: Genotip dağılımları ($p=0.004$) ve allel frekanslarına ($p=0.001$) bakıldığında her iki grup arasında anlamlı bir fark mevcuttur. OKB ile s alleli arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hasta grubunda s alleleline sahip olanların hipertimik mizaç puanları olmayanlara göre daha düşüktü. ($p=0.024$). Hastaların %41'i baskın bir afektif mizaca sahipti. Çoğunluğun (%18) birden fazla afektif mizacı mevcuttu, ikinci sırada anksiyöz mizaç (%11), ardından depresif mizaç (%10) gelmekteydi. Baskın mizaca sahip olan hastaların olmayanlara göre YBOKÖ ($p=0.003$), MOKBÖ ($p=0.000$), BDE ($p=0.000$) ve BAÖ ($p=0.000$) puanları anlamlı derecede yüksekti. YBOKÖ ile irritabl ve anksiyöz mizaç puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki, MOKBÖ, BDE ve BAI ile hipertimik mizaç puanları arasında negatif yönde, diğer mizaçlarla pozitif yönde anlamlı ilişki belirlendi.

SONUÇ: Literatürde OKB hastalarında afektif mizaç ve serotonin polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırıldığı başka bir çalışma bulunmamaktadır. OKB ile s alleli arasında bir ilişki belirlenmiş, baskın mizaç varlığı ile hastalık şiddeti ilişkili bulunmuştur. OKB BB birlikteliğine genetik bir bakış açısı sağlaması açısından çalışmamız önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: afektif mizaç, obsesif kompulsif bozukluk, serotonin transporter polimorfizmi

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE 2015 YILI İÇİNDE VERİLEN ADLİ PSİKİYATRİK RAPORLARIN İNCELENMESİ

Ömer Faruk Topaloğlu, Sedat Batmaz, Mesut Yıldız,
Emrah Songur

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğince 2015 yılı boyunca düzenlenmiş bulunan adli psikiyatrik raporların niteliklerinin incelenmesidir.

YÖNTEM: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda 2015 yılı boyunca düzenlenen adli psikiyatrik raporlar elektronik hasta dosyaları üzerinden geriye dönük olarak incelendi ve hakkında rapor düzenlenen kişilerin sosyodemografik özellikleri, rapor isteyen makam, adli rapor istenmesinin gerekçesi ve psikiyatrik tanının ne olduğu kaydedildi. SPSS paket bilgisayar programı kullanarak tanımlayıcı istatistiksel analizler yapıldı.

BULGULAR: İncelenen hasta kayıtlarından rapor düzenlenen 59 hastanın 36'sı (%62.1) erkek, 23'ü (%37.9) kadındı. Rapor alınması talebiyle gönderen makamlar incelendiğinde taleplerin 20 hasta için (%34.5) Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, 9 hasta için (%15.5) Ceza İnfaz Kurumu'ndan, 7 hasta için (%12.1) Asliye Ceza Mahkemesi'nden geldiği görüldü. Rapor isteme gerekçelerine bakıldığında olguların 18'i için (%31) ceza ehliyetinin sorgulandığı, 15'i için (%25.9) hakkında durum bildirir adli rapor istendiği, 7'si için (%12.1) akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesinin istendiği anlaşıldı. Olgulara konulan psikiyatrik tanılara bakıldığında 14'ü için (%24.1) herhangi bir ruhsal bozukluk düşünülmediği, 8'i için (%13.8) mental retardasyon, 6'sı için (%10.3) psikotik bozukluk, 5'i için (%8.6) depresif bozukluk, 3'ü için (%5.2) travma sonrası stres bozukluğu ve 3'ü için (%5.2) bipolar bozukluk tanısı konulduğu görüldü. Geri kalan tanılarının arasında anksiyete bozuklukları ve kişilik bozuklukları yer aldı. Olguların 14'ünün (%24.1) ise karar verilmesi için ek değerlendirme gerektirdiği için tekrar muayeneye çağırıldığı anlaşıldı.

SONUÇ: Bu bulgular adli psikiyatrik raporların değerlendirilme sürecinde hangi makamlarla temasta bulunulduğunu, ne tür raporların daha sıklıkla talep edildiğini ve ne gibi psikiyatrik tanıların daha sıklıkla ön plana çıktığını göstererek uzmanlık eğitimi sırasında göz önünde bulundurulacak noktalara vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: adli psikiyatri, adli rapor, ceza ehliyeti

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALAR İÇİN İSTENEN PSİKİYATRİ KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu Eser, Sedat Batmaz, Emrah Songur, Mesut Yıldız

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri servisinde istenen konsültasyonların niteliğinin ve yatan hastalarda psikiyatrik morbiditenin değerlendirilmesidir.